

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์

ข่าวสารด้านยาประจำเดือนมิถุนายน 2566

LOCOA[®]

Esflurbiprofen 40 mg transdermal patch

สำหรับบรรเทาอาการปวด
และภาวะอักเสบที่เกี่ยวข้องกับภาวะโรคข้อเสื่อม



Esflurbiprofen 40 mg transdermal patch (LOCOA®)

บรรจุภัณฑ์



ลักษณะของยา



ลักษณะแผ่นแปะ: ไม่มีสี ถึง มีสีเหลือง



Esflurbiprofen 40 mg transdermal patch (LOCOA[®])

กลุ่มยา Non-steroidal Anti-inflammatory drugs (NSAIDs)

ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวด และภาวะอักเสบที่สืบเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับ
ภาวะโรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis)

ขนาดยาและวิธีใช้ยา

- สามารถแปะได้ในบริเวณที่ต้องการได้วันละ 1 แผ่น
สูงสุดไม่เกิน 2 แผ่นต่อวัน
- ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยตับและไตบกพร่อง
ระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง




Esflurbiprofen 40 mg transdermal patch (LOCOA[®])

วิธีการใช้แผ่นแปะ

1. แกะแผ่นฟิล์มตรงกลางออก



2. แปะแผ่นแปะตรงบริเวณที่มีอาการ



3. แกะแผ่นฟิล์มด้านข้างออกจนหมด



ข้อแนะนำในการใช้ยา

- ทำความสะอาดผิว แล้วทำให้แห้ง **หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ทาผิวทุกชนิด** เนื่องจากอาจทำให้แผ่นแปะติดผิวได้ลดลง
- หากจำเป็นต้องแปะบริเวณที่มีขน ให้ตัดเล็มขนออกให้สั้นสุดก่อน **ไม่ควรโกน**เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองเพิ่มขึ้น
- **ห้าม**แปะบริเวณที่มีแผล เยื่อเมือก อักเสบ ผื่น
- **ห้าม**แปะแผ่นยา มากกว่า 2 แผ่นในคราวเดียว

การเก็บยา

- เก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ได้รับมา
- เก็บให้พ้นจากแสงและความร้อนชื้น



Esflurbiprofen 40 mg transdermal patch (LOCOA[®])

ข้อห้ามใช้

- เป็นโรคแผลในทางเดินอาหาร
- มีความผิดปกติของระบบเลือดแบบรุนแรง
- เป็นโรคตับระดับรุนแรง หรือโรคไตระดับรุนแรง
- เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับรุนแรง
- เป็นโรคความดันโลหิตสูงระดับรุนแรง
- มีประวัติแพ้ส่วนประกอบใน LOCOA หรือ flurbiprofen
- ผู้ที่เป็นหรือมีประวัติโรคหืดจากการใช้ยาแอสไพริน (Aspirin-induced asthma)
- ผู้ป่วยที่ใช้ Enoxacin hydrate, Lomefloxacin, Norfloxacin, Prulifloxacin
- หญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 3



ข้อควรระวัง

- เคยมีแผลในกระเพาะอาหาร หรือแผลในทางเดินอาหาร จากการ
ใช้ NSAIDs ชนิดอื่นมาก่อน
- มีความเสี่ยงในการเกิดเลือดออก
- เคยมีตับหรือไตผิดปกติ หรือมีการลดลงของกระแสเลือดที่ไต
- มีโรคหอบหืด หรือโรคความดันโลหิตสูง
- มีความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด

Esflurbiprofen 40 mg transdermal patch (LOCOA[®])

อาการไม่พึงประสงค์

รายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อย :
อาการแดง, คัน, ผื่นผิวหนัง

อันตรกิริยาที่สำคัญ

- Enoxacin hydrate, Lomefloxacin, Norfloxacin, Prulifloxacin : การใช้ร่วมกับยาดังกล่าว อาจเหนี่ยวนำให้เกิดการชักจากการยับยั้ง Gamma-Aminobutyric Acid (GABA)



Esflurbiprofen 40 mg transdermal patch (LOCOA[®])

การใช้ยาในประชากรกลุ่มพิเศษ

ผู้สูงอายุ

- สามารถใช้ได้

โดยควรใช้ในขนาดต่ำที่สุด และติดตามอาการข้างเคียง



หญิงตั้งครรภ์

- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 3
- ในสตรีมีครรภ์ไตรมาสแรกและไตรมาสสอง ให้ใช้ในกรณีที่พิจารณาแล้วพบว่าประโยชน์ที่ได้มีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

หญิงให้นมบุตร

- หลีกเลี่ยงการใช้ในหญิงให้นมบุตร
- ในกรณีจำเป็น ควรพิจารณาใช้หลังหยุดให้นมบุตร



เด็ก

- ไม่แนะนำให้ใช้ เนื่องจากไม่มีการศึกษาในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี