

กลุ่มงานเภสัชกรรม  
โรงพยาบาลนครพิงค์  
**ข่าวสารด้านยา**  
ประจำเดือนกันยายน 2566




แจ้งรายการยาหยุดตาเข้าใหม่  
เข้าทดแทน Exopred®

ชื่อการค้า

Zylet®

ยาใหม่



ชื่อสามัญทางยา

Loteprednol Etabonate 0.5% +  
Tobramycin 0.3% ophthalmic suspension

ส่วนประกอบทางเคมี

ใน 1 ml ประกอบด้วยสารสำคัญ  
Loteprednol Etabonate 5 mg (0.5%) และ  
Tobramycin 3 mg (0.3%)



ส่วนประกอบอื่นๆ

Edetate Disodium, Glycerin, Povidone, Purified Water,  
Tyloxapol, Benzalkonium Chloride 0.01%, Sulfuric Acid,  
Sodium Hydroxide

ขนาดบรรจุ

5ml

กลุ่มงานเภสัชกรรม  
โรงพยาบาลนครพิงค์  
**ข่าวสารด้านยา**  
ประจำเดือนกันยายน 2566



# Zylet®

## กลุ่มยา

### Antibacterials with corticosteroids

## ข้อบ่งใช้

1. ใช้สำหรับการอักเสบในลูกตาที่ตอบสนองต่อสเตียรอยด์ ที่เจาะจงใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ หรือการติดเชื้อหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียในลูกตา โดยจะครอบคลุมเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อตา ได้แก่

Staphylococci รวมทั้ง *S.aureus* และ *S.epidermidis* (coagulase-positive และ coagulase-negative) รวมทั้ง Penicillin resistant strains.

Streptococci รวมทั้ง some of the Group A-beta-hemolytic species, some nonhemolytic species และ some *Streptococcus pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterobacter aerogenes*, *Proteus mirabilis*, *Morganella morganii*, most *Proteus vulgaris* strains, *Haemophilus influenzae* และ *H. aegyptius*, *Moraxella lacunata*, *Acinetobacter calcoaceticus* และ some *Neisseria species*

2. Chronic anterior Uveitis

3. การบาดเจ็บของกระจกตาเนื่องจากสารเคมี หรือ การไหม้ เนื่องจากรังสีหรือความร้อน หรือ การบาดเจ็บจากสิ่งแปลกปลอม

## ขนาดยา

**\*\*เขย่าขวดก่อนใช้ยา\*\***

หยอด 1-2 หยด ทุก 4-6 ชั่วโมง

ระหว่าง 24-48 ชั่วโมงแรกของการรักษา สามารถเพิ่มขนาดยาเป็นหยดได้ทุก ๆ 1-2 ชั่วโมง

เมื่อมีอาการน้อยลงควรลดความถี่ในการใช้ยาลง

กลุ่มงานเภสัชกรรม  
โรงพยาบาลนครพิงค์  
ข่าวสารด้านยา  
ประจำเดือนกันยายน 2566



# Zylet®

## ข้อห้ามใช้

- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติหรือสงสัยว่าแพ้ ส่วนประกอบของยาและคอร์ติโคสเตียรอยด์อื่น
- ไม่ควรใช้เมื่อมีการติดเชื้อไวรัสที่กระจกตา และเยื่อบุตา รวมถึงกระจกตาอักเสบจากเชื้อ herpes simplex (เช่น dendritic keratitis) เชื้อ vaccinia และอีสุกอีใส รวมถึงเชื้อวัณโรคที่ตา และการติดเชื้อราที่ตาส่วนต่าง ๆ

## คำเตือน

1. ห้ามใช้ฉีดเข้าไปในลูกตา
2. การใช้สเตียรอยด์เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดต้อหิน และทำลายประสาทตา ความบกพร่องของสายตาลานสายตา และต่อกระจกในผู้ป่วยต้อหินควรใช้สเตียรอยด์ด้วยความระมัดระวัง ในผู้ป่วยบางรายที่ไวต่อยา aminoglycosides เมื่อเกิดความไวต่อสารนี้ควรหยุดใช้ยา
3. การใช้สเตียรอยด์เป็นระยะเวลานานอาจลดภูมิคุ้มกัน และเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดติดเชื้อแทรกซ้อนที่ตา หรืออาจเพิ่มความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสต่างๆที่ตา

# ข่าวสารด้านยา ประจำเดือนกันยายน 2566



## Zylet®

### อาการไม่พึงประสงค์

- superficial punctate keratitis
- เพิ่มความดันในลูกตา
- อาการไหม้และปวดแสบ
- มีอาการไม่พึงประสงค์ทางตา ได้แก่ การมองเห็นผิดปกติ น้ำตาไหล คัน lacrimation disorder กลัวแสง corneal deposits ไม่สบายตา eyelid disorder
- ปวดศีรษะ

### Drug Interaction

ยังไม่มีรายงานปฏิกิริยาต่อยาอื่น  
อย่างไรก็ตามหากต้องหยอดตาพร้อมกับยาอื่น ๆ  
มีข้อแนะนำสำหรับลำดับการใช้ยาดังนี้ คือ  
เริ่มด้วยยาน้ำใส (Solution)



ยาน้ำแขวนตะกอน (Suspension)



เจล (Gel)



ยาขี้ผึ้ง (Ointment)

โดยให้เว้นระยะห่างประมาณ 5 นาที

กลุ่มงานเภสัชกรรม  
โรงพยาบาลนครพิงค์  
ข่าวสารด้านยา  
ประจำเดือนกันยายน 2566



# Zylet®

การใช้ยาในเด็ก

ยังไม่มีการศึกษาถึงความปลอดภัย  
และประสิทธิภาพในเด็ก

การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์

**Pregnancy category C**

ไม่มีการศึกษาที่เพียงพอในหญิงตั้งครรภ์  
ควรพิจารณาใช้เมื่อประโยชน์ที่ได้รับมากกว่า  
ความเสี่ยงของทารกในครรภ์

การใช้ยาในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูลการขับออกของยาทางน้ำนม  
ระมัดระวังการใช้ในหญิงให้นมบุตร

การเก็บยา

เก็บที่อุณหภูมิห้อง 25 °C **\*\*ห้ามแช่แข็ง\*\***

