

ข่าวสารด้านยาประจำเดือนสิงหาคม 2567

FASENRA 30 MG

Benralizumab 30 mg/1 mL
pre-filled syringe




ใช้เป็นการรักษาเสริมในผู้ป่วยโรคหอบหืดรุนแรง
ที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้


FASENRA 30 MG

ลักษณะบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ด้านหน้า



บรรจุภัณฑ์ด้านหลัง



บรรจุภัณฑ์ pre-filled syringe ด้านใน



FASENRA 30 MG


ข้อบ่งใช้

ใช้เป็นการรักษาเสริมในผู้ป่วยโรคหอบหืดรุนแรงที่มี eosinophil สูง และไม่สามารถควบคุมอาการโดยใช้ยา high-dose inhaled corticosteroid ร่วมกับ long acting beta agonists

ขนาดยาและวิธีการใช้ยา

- ฉีดยา 30 mg **subcutaneous** (1 เข็ม) ทุก ๆ 4 สัปดาห์ ใน 3 โดสแรก หลังจากนั้นให้ฉีดทุก ๆ 8 สัปดาห์
- หากไม่ได้ฉีดยาตามกำหนด ให้ฉีดทันทีที่สามารถทำได้ โดยที่ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า
- ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคตับและโรคไต



ส่วนประกอบของกระบอกฉีดยา





FASENRA 30 MG

วิธีการใช้ยา

1. หยิบยาขึ้นมาโดยให้จับที่ syringe body (ห้ามจับ plunger) จากนั้นตรวจสอบวันหมดอายุ และลักษณะภายนอก ห้ามใช้ยาหากมีลักษณะขุ่น สีเปลี่ยนไป หรือมีตะกอนขนาดใหญ่เกิดขึ้น





2. ถอด needle cover ออก โดยห้ามสัมผัสที่ plunger หรือ plunger head ห้ามใช้หาก prefilled syringe มีการเสียหายหรือปนเปื้อน (เช่น ทำตก)





3. ค่อยๆ ดึงผิวหนังขึ้นมา และทำการแทงเข็มฉีดยาลงไปลงผิวหนัง (ควรฉีดยาบริเวณต้นแขน เอว หรือท้อง)

FASENRA 30 MG


วิธีการใช้ยา



4. ฉีดยาโดยดัน plunger เข้ามาจนสุดถึงบริเวณ needle guard activation clip ซึ่งจะทำให้ needle guard ทำงาน



5. กด plunger ค้างไว้ แล้วถอนเข็มออกจากผิวหนัง จากนั้นจึงหยุดกด plunger ซึ่งจะช่วยให้หัวเข็มถูกดันกลับเข้าไปใน syringe body



6. ทิ้ง syringe ลงในภาชนะที่เหมาะสม

FASENRA 30 MG

ข้อแนะนำในการใช้ยา

- ยานี้ควรฉีดโดยบุคลากรทางการแพทย์
- ควรฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง บริเวณต้นแขน สะโพก หรือหน้าท้อง
- **ไม่ควรฉีด** บริเวณผิวหนังที่ตึง ช้ำ บวมแดง หรือหนา


ข้อห้ามใช้

- **ห้ามใช้** ในผู้ที่แพ้ยา หรือส่วนประกอบของยานี้

ผลข้างเคียงของยา

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไป (common)

- คออักเสบ (Pharyngitis)
- Hypersensitivity reactions
- ปวดศีรษะ (Headache)
- ไข้ (Pyrexia)
- อาการบวมแดงบริเวณรอบๆที่ฉีดยา (Injection site reaction)



FASENRA 30 MG

ข้อควรระวัง



- ไม่ควรใช้ยานี้สำหรับรักษา acute asthma exacerbation




- ควรให้ผู้ป่วยกลับมาปรึกษาแพทย์ หากผู้ป่วยยังคงมีอาการของโรคหอบหืดไม่ได้หลังจากใช้ยานี้



- ไม่ควรหยุดยา corticosteroid ทันทีหลังจากเริ่มใช้ยานี้ โดยควรค่อยๆ ปรับลดขนาดยา corticosteroid ลงแทน



- ควรเฝ้าระวังการเกิด anaphylactic & hypersensitivity reactions โดยพบว่าส่วนใหญ่มักเกิดอาการภายใน 24 ชม. และผู้ป่วยที่มีประวัติของ anaphylaxis มาก่อน จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการแพ้ยานี้



- การศึกษาได้มีการ exclude ผู้ป่วยที่กำลังมีการติดเชื้อปรสิตออก ดังนั้นผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อปรสิตจึงควรได้รับการรักษาการติดเชื้อก่อนใช้ยานี้ และหากมีการติดเชื้อปรสิตระหว่างใช้ยานี้แล้วพบว่าไม่ตอบสนองต่อยา anti-helminth ให้ทำการหยุดยานี้จนกว่าจะหายจากการติดเชื้อ

FASENRA 30 MG

การใช้ในประชากรกลุ่มพิเศษ

เด็ก

- ไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี



หญิงตั้งครรภ์

- ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่เพียงพอในการใช้ยา Fasenra ในหญิงตั้งครรภ์ แพทย์ควรประเมินระหว่างประโยชน์และความเสี่ยง



หญิงให้นมบุตร

- ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่เพียงพอในการใช้ยา Fasenra ในหญิงให้นมบุตร แพทย์ควรประเมินระหว่างประโยชน์และความเสี่ยง



ผู้สูงอายุ

- ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยา



FASENRA 30 MG

การเก็บรักษา

- เก็บในตู้เย็น อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส
- หากนำยาออกมานอกตู้เย็นแล้ว จะต้องใช้ภายใน 14 วัน (ที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส)
- ควรเก็บรักษายาทั้งกล่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ยาโดนแสง
- **ห้ามแช่แข็ง** ห้ามให้ยาโดนความร้อน และห้ามเขย่า

