




กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์



ข่าวสารด้านยาประจำเดือนมกราคม 2568

Cytisine GPO

ไซทีซีน จีพีโอ



Cytisinicline 1.5 mg tablets

งานเภสัชสนเทศ กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลนครพิงค์ 2 มกราคม 2568

Cytisine GPO

for smoking cessation



ลักษณะบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุยา




★ บรรจุกล่องละ 10 แผง แผงละ 10 เม็ด

ลักษณะเม็ดยา



ลักษณะแผงยา



★ ยาเม็ดรูปกลมมน สีขาว ด้านหนึ่งมีอักษร "C"
อีกด้านหนึ่งเรียบ

งานเภสัชสนเทศ กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลนครพิงค์ 2 มกราคม 2568



Cytisine GPO

for smoking cessation



ชื่อการค้า

Cytisine GPO

ชื่อสามัญ

Cytisinicline

รูปแบบ

ยาเม็ด

ความแรง

1 เม็ด ประกอบด้วยยา Cytisinicline 1.5 mg

กลุ่มยา

Drugs used in smoking cessation

ข้อบ่งใช้

ยานี้ใช้ร่วมกับการบำบัดพฤติกรรมเพื่อเลิกบุหรี่

บัญชียาหลัก

ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี ก

Cytisine GPO

for smoking cessation



ขนาดยาที่แนะนำ

- ก่อนใช้ยานี้ ต้องกำหนดวันที่จะหยุดสูบบุหรี่ร่วมกับแพทย์ หรือ เภสัชกร
- ในช่วง 4 วันแรกที่รับประทานยา ควรลดปริมาณการสูบบุหรี่ลง และ **หยุดสูบบุหรี่ในวันที่ 5 ของการรับประทานยา**



วิธีรับประทานยา

วิธีที่ 1

- รับประทานยาครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง พร้อมหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 25 วัน

วิธีที่ 2

รับประทานยานี้เป็นระยะเวลา 25 วัน ดังนี้

- วันที่ 1 ถึง 3 รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 2 ชั่วโมง (รวม 6 เม็ดต่อวัน)
- วันที่ 4 ถึง 12 รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 2.5 ชั่วโมง (รวม 5 เม็ดต่อวัน)
- วันที่ 13 ถึง 16 รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 3 ชั่วโมง (รวม 4 เม็ดต่อวัน)
- วันที่ 17 ถึง 20 รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 5 ชั่วโมง (รวม 3 เม็ดต่อวัน)
- วันที่ 21 ถึง 25 รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 6 ชั่วโมง (รวม 2 เม็ดต่อวัน)

Cytisine GPO

for smoking cessation



ข้อห้ามใช้ยา

- คนที่แพ้ Cytisinicline หรือ แพ้องค์ประกอบอื่นๆในตำรับ
- หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
- โรคหลอดเลือดแดงแข็งระดับรุนแรง
- โรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้
- โรคจิตเภทบางประเภท
- Pheochromocytome
- ภาวะบกพร่องอย่างรุนแรงของระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น หลังเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันหรือโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด และหัวใจเต้นผิดจังหวะ
- โรคกรดไหลย้อน



คำเตือนและข้อควรระวังพิเศษในการใช้งาน

การศึกษาทางคลินิกมีไม่เพียงพอสำหรับความปลอดภัยในการใช้ Cytisine GPO ควรใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วย ดังนี้

- โรคหลอดเลือดหัวใจ
- ภาวะหัวใจล้มเหลว
- ความดันโลหิตสูง
- โรคหลอดเลือดสมอง
- การอุดตันของหลอดเลือด
- โรคไต
- โรคตับ
- ภาวะไทรอยด์ทำงานมากเกินไป
- โรคแผลในกระเพาะอาหาร
- โรคเบาหวาน

Cytisine GPO

for smoking cessation



การใช้ยาในประชากรกลุ่มพิเศษ



ผู้ป่วยโรคตับและโรคไต



ไม่มีการศึกษาทางคลินิกของ Cytisine GPO ในผู้ป่วยโรคตับหรือโรคไต
ดังนั้น การใช้ Cytisine GPO **ไม่แนะนำ**ในผู้ป่วยโรคตับหรือโรคไต

ผู้สูงอายุ



ไม่มีการศึกษาทางคลินิกของ Cytisine GPO ในผู้ป่วยสูงอายุ
ดังนั้น การใช้ Cytisine GPO **ไม่แนะนำ**ในผู้ป่วยอายุ > 65 ปี

เด็ก

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ Cytisine GPO ยัง**ไม่ได้รับการยืนยัน**
ในผู้ป่วยเด็กอายุ < 18 ปี
ดังนั้น การใช้ Cytisine GPO **ไม่แนะนำ**ในผู้ป่วยเด็กอายุ < 18 ปี



Cytisine GPO



for smoking cessation



อายุยา


2 ปี

การเก็บรักษา



เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา


เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง
ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส



ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว



เก็บยาให้พ้นมือเด็ก



ควรแกะยาเมื่อรับประทานในแต่ละครั้งเท่านั้น
ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้

งานเภสัชสนเทศ กลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลนครพิงค์ 2 มกราคม 2568

