



# กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์



ข่าวสารด้านยา ประจำเดือนเมษายน 2568

## ANORO ELLIPTA®

(Umeclidinium 62.5 mcg + Vilanterol 25 mcg per puff)





# กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์

## ชื่อสามัญทางยา

Umeclidinium 62.5 mcg / Vilanterol 25 mcg per puff

## รูปแบบยา

ยาพ่นสูดชนิดผงแบบ pre-dispensed  
อุปกรณ์พ่นยาสูดที่พร้อมซึ่งมีช่องบอกตัวเลขพร้อมด้วยฝาครอบปากกระบอก  
สีแดง บรรจุแถบบลิสเตอร์ 2 แผง ซึ่งแต่ละแผงบรรจุผงยาสูดขาว

## ขนาดบรรจุ


30 dose ต่อ 1 กระบอกยา


## ข้อบ่งใช้

รักษาโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease หรือ COPD) สำหรับคงผลการรักษาเพื่อให้ทางเดินหายใจ  
ที่อุดตันเกิดการขยาย

## ขนาดและวิธีใช้ยา

ใช้สำหรับสูดพ่นทางปาก 1 puff วันละครั้ง เวลาเดิมทุกวัน






## ลักษณะบรรจุภัณฑ์

### กล่องยาด้านหน้า



### กล่องยาด้านหลัง




### ถาดบรรจุ



### เครื่องพ่นยา

### ด้านหน้า-ด้านหลัง






## จำนวนครั้งที่สามารถสูดพ่นได้

30 puff ต่อ 1 กระบอก


ขนาดยาในภาชนะบรรจุก่อนพ่นยาประกอบด้วย umeclidinium 62.5 mcg และ vilanterol 25 mcg (ในรูปของ trifenate)

## ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยา




## ข้อควรทราบในการใช้เครื่องพ่นยา

- หากแกะเครื่องพ่นยาออกจากถาดบรรจุ **สามารถเก็บได้นาน 6 สัปดาห์**
- ห้ามเขย่าเครื่องพ่นยา และห้ามพ่นลมหายใจลงบนเครื่องพ่นยา
- แต่ละครั้งที่เปิดฝา ได้เตรียมยา 1 dose หากทำการเปิดและปิดฝาครอบโดยไม่ได้พ่นยาจะสูญเสียยา dose นั้นไป
- ระวังอย่าให้นิ้วไปปิดช่องระบายอากาศระหว่างสูดยา
- หากต้องการทำความสะอาดปากกระบอก ให้ใช้กระดาษทิชชูแห้งเช็ดก่อนปิดฝา




## วิธีการใช้เครื่องพ่นยา



### เปิด ✨ ขั้นตอนที่ 1

เปิดฝาเครื่องพ่นยา โดยการเลื่อน  
ฝาดรอปลงจนได้ยินเสียง “คลิก”

**ควรเปิดฝาดรอปเมื่อพร้อมจะสูดยาเท่านั้น**



### สูด ✨ ขั้นตอนที่ 2

ถือเครื่องพ่นยาให้ห่างจากปากไว้ก่อน  
แล้วหายใจออกให้เต็มที่


**ห้ามพ่นลมหายใจเข้าไปในเครื่องพ่นยา**



### ขั้นตอนที่ 3


- วางปากกระบอกไว้ระหว่างริมฝีปาก และและปิดริมฝีปากให้สนิทรอบปาก กระบอกพ่น ริมฝีปากควรพอดีกับรูปร่างโค้งปากกระบอก
- **ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศด้วยนิ้วมือ**
- สูดลมหายใจเข้าทางปาก 1 ครั้ง ให้ยาวต่อเนื่องและลึก

## วิธีการใช้เครื่องพ่นยา



### ขั้นตอนที่ 4

เอาเครื่องพ่นยาออกจากปากและ  
กลั้นหายใจไว้ประมาณ 3 ถึง 4 วินาที  
(หรือให้ได้นานเท่าที่ทำได้)



### ขั้นตอนที่ 5

- หายใจออกช้าๆ และเบาๆ
- หากไม่รับรู้ถึงรสชาติยาไม่จำเป็นต้องสูดยาซ้ำ


**ปิด**

### ขั้นตอนที่ 6


- สามารถทำความสะอาดส่วนปาก  
กระบอกได้ โดยใช้กระดาษทิชชูแห้ง  
ก่อนปิดฝาครอบ ไม่จำเป็นต้อง  
ทำความสะอาดเป็นประจำ
- เลื่อนฝาครอบขึ้นไปบนส่วนปาก  
กระบอกให้สุด



วิดีโอสาริตวิธีการใช้Anoro ellipta®



## การสังเกตปริมาณยาที่เหลืออยู่ในเครื่องพ่นยา



- **เมื่อยาในเครื่องพ่นยาเหลืออยู่ไม่ถึง 10 puff** ครึ่งซ้ายของช่องบอกตัวเลขจะปรากฏเป็นสีแดง เพื่อเตือนเปลี่ยนเครื่องพ่นยา
- **แสดงตัวเลข 0 แสดงว่ายาหมดแล้ว** หากเปิดฝาครอบหลังจากนี้ ช่องบอกตัวเลขจะแสดงเป็นสีแดงทั้งช่อง
- **ทิ้งเครื่องพ่นยาที่หมดแล้วลงในถังขยะ** ในครัวเรือน ให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง


## ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้โปรตีนในนมอย่างรุนแรง

## ผลข้างเคียงของยา



ไอ



เจ็บคอ



ปากแห้ง



ท้องผูก

## การเก็บรักษา

เก็บในอุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส  
หากเก็บยานี้ไว้ในตู้เย็น ให้นำยาออกมาไว้ที่อุณหภูมิห้องอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนการใช้ยา


## คำเตือนและข้อควรระวัง



ไม่มีการศึกษาการใช้ยาในผู้ป่วยโรคหูตึง  
ดังนั้น ไม่แนะนำในผู้ป่วยกลุ่มนี้




ยามีข้อบ่งใช้สำหรับการควบคุมโรคหลอดเลือดกั้นเรื้อรัง  
ดังนั้น ไม่ควรใช้เพื่อรักษาอาการเฉียบพลันจากหลอดเลือดแดง




ยาทำให้เกิดหลอดเลือดแดงแบบผิดปกติ  
ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต  
ดังนั้น ควรหยุดการรักษาหากเกิดอาการดังกล่าว



อาจพบผลกระทบต่อหัวใจและหลอดเลือด เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ  
ได้แก่ ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้วและเต้นเร็วผิดปกติ  
ดังนั้น ควรใช้ยาอย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ  
และหลอดเลือดอย่างรุนแรง



เนื่องจากฤทธิ์ antimuscarinic ของยา  
ดังนั้น ควรใช้ยาอย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่เป็น  
ต้อหินชนิดมุมแคบหรือปัสสาวะคั่ง




## การใช้ในประชากรกลุ่มพิเศษ

### เด็ก

ไม่มีข้อบ่งชี้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี  
ดังนั้น ไม่แนะนำในผู้ป่วยกลุ่มนี้




### ผู้ป่วยไตบกพร่อง



ไม่มีความจำเป็นต้องปรับขนาดยา

### ผู้ป่วยตับบกพร่อง



ไม่มีความจำเป็นต้องปรับขนาดยาในระดับ Mild หรือ Moderate และยังไม่มีการศึกษาระดับ Severe

### หญิงมีครรภ์

### หญิงให้นมบุตร



ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่เพียงพอในการใช้ยา  
ดังนั้น แพทย์ควรประเมินประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
ต่อมารดาด้วยความเสี่ยงที่จะเกิดต่อทารกก่อนใช้ยา



### ผู้สูงอายุ

ไม่มีความจำเป็นต้องปรับขนาดยา  
ในผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี

