



โรงพยาบาลนครพิงค์
Nakorping Hospital Chiang Mai

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์

ข่าวสารด้านยาประจำเดือน กรกฎาคม 2569

รายการยาเข้าใหม่



Systane[®]
COMPLETE
LUBRICANT EYE DROPS



BUSONINE 64
Nasal spray SCENT-FREE

งานเภสัชสนเทศ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569

Systane Complete Eye Drops

Systane[®] ULTRA
LUBRICANT EYE DROPS



ยาเก่า

Systane[®] COMPLETE
LUBRICANT EYE DROPS



ยาใหม่

ขนาดบรรจุ 5 ml

ชื่อการค้า	Systane [™] ULTRA
ตัวยาสำคัญ	Polyethylene glycol 400 + Propylene glycol
ความแรง	0.4% + 0.3%
รูปแบบยา	Solution
อายุหลังเปิดใช้	1 เดือน



Systane [™] COMPLETE
Propylene glycol
0.6%
Emulsion
6 เดือน

ข้อบ่งใช้

รักษาอาการตาแห้ง บรรเทาอาการแสบและระคายเคืองแบบชั่วคราว เนื่องจากความแห้งของดวงตา

ขนาดยาและวิธีการใช้ยา

- หยอดยา 1-2 หยด ในดวงตาข้างที่มีอาการ จากนั้นให้กะพริบตาเบาๆ
- เชย้าขวดก่อนใช้ยาทุกครั้ง
- สามารถใช้ SYSTANE Complete ได้ตามต้องการตลอดทั้งวันเพื่อบรรเทาอาการตาแห้ง
- สำหรับผู้ใส่คอนแทคเลนส์ สามารถใช้ก่อนใส่หรือหลังถอดคอนแทคเลนส์

การเก็บรักษา

- เก็บยาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C
- สามารถใช้ยาได้ถึง 6 เดือน หลังการเปิดใช้งาน
- ควรเก็บยาให้พ้นจากแสงแดด

อาการไม่พึงประสงค์



ตาแดง



ตาบวม



คัน/ระคายเคืองตา


หากมีอาการเหล่านี้ ควรหยุดใช้และปรึกษาแพทย์



ปวดตารุนแรง



มองเห็นภาพไม่ชัด



ตาแดง/น้ำตาไหลผิดปกติ

ข้อควรระวัง

- หลีกเลี่ยงการให้ปลายหลอดหยดสัมผัสกับพื้นผิวใด ๆ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
- หลีกเลี่ยงการใช้หากพบว่าสีของอิมัลชัน (สีขาว) เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
- หลังใช้ยาอาจมองเห็นไม่ชัดชั่วคราว แนะนำให้รอจนกว่าการมองเห็นกลับมาเป็นปกติก่อนขับขี่ยานพาหนะ/ทำงานเครื่องจักร
- สามารถใช้ได้ทั้งในหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร

Budesonide Nasal Spray

ยาเก่า



**BESONIN AQUA
NASAL SPRAY**

**Budesonide
50 mcg/spray**

ยาใหม่



BUSONINE 64

**Nasal spray
SCENT-FREE**

**Budesonide
64 mcg/spray**

ยาเก่า

ยาใหม่



ชื่อการค้า

BESONIN



ตัวยาสำคัญ/ความแรง

Budesonide
50 mcg/spray



รูปแบบยา

Nasal spray, suspension



จำนวน dose/ขวด

200



BUSONINE 64

Budesonide
64 mcg/spray

Nasal spray, suspension

120

ขนาดยาและวิธีการใช้ **BUSONINE 64**

สำหรับการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
(Allergic rhinitis)

- เด็กช่วงอายุ 6 ปี ถึงต่ำกว่า 12 ปี :
พ่นจมูกข้างละ 1 puff วันละ 1 ครั้ง (128 mcg/วัน)
- เด็กอายุ 12 ปีหรือมากกว่า และผู้ใหญ่ :
พ่นจมูกข้างละ 2 puff วันละ 1 ครั้ง หรือ
พ่นจมูกข้างละ 1 puff วันละ 2 ครั้ง (256 mcg/วัน)

สำหรับการรักษาและป้องกันโรคติดเชื้อหวัด

- เด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไป และผู้ใหญ่
พ่นจมูกข้างละ 1 puff วันละ 2 ครั้ง (256 mcg/วัน)

การเก็บรักษา

- เก็บยาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C และไม่ควรแช่เย็น
- สามารถใช้ยาได้ถึง 1 เดือน หลังการเปิดใช้งาน
- ควรเก็บยาให้พ้นจากแสงแดด

อาการไม่พึงประสงค์

อาจมีอาการระคายเคืองในช่องจมูก
หรืออาจเกิดอาการคันหรือแผล
ที่บริเวณเยื่อจมูกและผนังกันจมูก

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้
หรือส่วนประกอบอื่นๆ ในตำรับนี้

ข้อควรระวัง

- การใช้ยาเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดภาวะฮอร์โมนคอร์ติซอลเกิน
- Budesonide สามารถใช้ได้ในสตรีมีครรภ์
- ข้อมูลการใช้ยาในหญิงให้นมบุตรยังไม่เพียงพอ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง