

ข่าวสารด้านยาประจำเดือนสิงหาคม 2569

Benzydamine Hydrochloride Spray

0.15%



D-Throat Spray[®]

เหมาะสำหรับเด็กอายุ < 6 ปี

0.3%



Difflam Forte[®]

เหมาะสำหรับอายุ ≥ 6 ปี

D-Throat Spray 0.15%®

Difflam Forte 0.3%®

ชื่อสามัญทางยา

Benzydamine Hydrochloride

รูปแบบยา

Oromucosal spray

ความแรง

D-Throat Spray 0.15%®:

1 ml ประกอบด้วย Benzydamine HCl 1.5 mg

Difflam Forte 0.3%®:

1 ml ประกอบด้วย Benzydamine HCl 3 mg

ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดชั่วคราวในช่องปากและคอ ซึ่งรวมถึง

- ทอนซิลอักเสบ เจ็บคอ
- เยื่อぶปากอักเสบจากรังสี
- แผลร้อนใน
- คออักเสบ อาการบวม แดง
- ภาวะอักเสบหลังจากผ่าตัดเหงือกและฟัน



Difflam Forte 0.3%®

วิธีใช้ยา

พ่นบริเวณที่ปวด หรืออักเสบบริเวณช่องปาก

ขนาดยาที่แนะนำ Difflam Forte 0.3%®

อายุ	ขนาดยา
เด็ก < 6 ปี	ไม่แนะนำให้ใช้ 
เด็ก 6-12 ปี	พ่นครั้งละ 2 ที่ อาจพ่นยาซ้ำทุก 3 ชั่วโมงตามความจำเป็น แต่ไม่เกินวันละ 6 ครั้ง
ผู้ใหญ่และเด็ก > 12 ปี	พ่นครั้งละ 2-4 ที่ อาจพ่นยาซ้ำทุก 2-3 ชั่วโมง แต่ไม่เกินวันละ 6 ครั้ง



D-Throat Spray 0.15%®



ขนาดยาที่แนะนำ

เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี: พ่นครั้งละ 1 ที ต่อน้ำหนักตัว 4 kg พ่นได้สูงสุด 4 ที พ่นยาซ้ำได้ทุก 1.5-3 ชั่วโมงถ้าจำเป็น

ขนาดยาที่แนะนำให้ใช้ D-Throat Spray 0.15%®

อายุ	น้ำหนัก (Kg)	จำนวน spray ที่ <u>แนะนำต่อครั้ง</u> (puff)	จำนวน spray ที่แนะนำ <u>สูงสุดต่อวัน</u> (puff) (พ่นซ้ำได้ไม่เกิน 6 ครั้ง/วัน)
< 6 ปี	4-7	1	6
	8-11	2	12
	12-15	3	18
	>16	4	24
6-12 ปี	-	4	24
>12 ปี	-	4-8	48



ข้อห้ามใช้

1. คนที่แพ้สาร Benzydamine Hydrochloride หรือสารประกอบอื่นๆ ในตำรับ
2. ผู้ที่มีอาการหอบหืด ลมพิษ หรือโพรงจมูกอักเสบแบบเฉียบพลันจากการแพ้ยา กลุ่ม แอสไพริน หรือกลุ่ม NSAIDs
3. ผู้ที่มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร หรือ ลำไส้ทะลุ
4. ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต อย่างรุนแรง
5. ผู้ที่เป็นโรคไข้เลือดออก

การปรับเปลี่ยนขนาดยาในผู้ป่วยไตเสื่อม

ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยา

การปรับเปลี่ยนขนาดยาในผู้ป่วยตับเสื่อม

ไม่มีข้อมูลการปรับยา

D-Throat Spray 0.15%® Difflam Forte 0.3%®

ลักษณะบรรจุภัณฑ์

D-Throat Spray 0.15%

กล่องด้านหน้า



กล่องด้านหลัง



ขวดด้านหน้า



ขวดด้านหลัง




ขวดตอนเปิดฝา




Difflam Forte 0.3%

กล่องด้านหน้า



กล่องด้านหลัง



ขวดยา



D-Throat Spray 0.15%®

Difflam Forte 0.3%®

อาการไม่พึงประสงค์

ชา หรือปวดแสบร้อนบริเวณปาก

การใช้ยาในประชากรกลุ่มพิเศษ



หญิงตั้งครรภ์

- ไม่มีข้อมูลความปลอดภัย ควรพิจารณาถึงความเสี่ยงและประโยชน์หากจำเป็นต้องใช้
- **ไม่แนะนำ**ให้ใช้ในการตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 3

สตรีให้นมบุตร

- ไม่มีข้อมูลการขับออกทางน้ำนม ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

วิธีเก็บรักษา

- **หลีกเลี่ยง**การเก็บยาในบริเวณที่โดนแสง ความชื้น
- ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิ < 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในตู้เย็น หรือแช่แข็ง

D-Throat Spray 0.15%® หลังเปิดใช้เก็บได้นาน 6 เดือน
Difflam Forte 0.3%® หลังเปิดใช้เก็บได้นานเท่าอายุยาข้างขวด